ALLIN

Oxyclozanide y LEVAMISOL

1000ml.

PARA USO VETERINARIO



AGÍTESE ANTES DE USAR

Venta bajo receta médica

RANCHAY

INDICACIONES

ALLIN OXYCLOZANIDE Y LEVAMISOL está indicado en el tratamiento y control de infestaciones por fascioliasis, paramfistomiasis, nematodos gastrointestinales y pulmonares; del hígado, órganos gastrointestinales y pulmonares respectivamente.
Es usado en programas de control y erradicación 3 veces al año.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS:

Vía oral, agitar bien el frasco antes de administrar.

TABLA DE DOSIFICACIÓN	
Bovinos y terneros	2.5 ml. por cada 10 kg de peso vivo.
Ovejas y cabras	0.5 ml. por cada 2 kg de peso vivo.

ESPECIES DE DESTINO:

Bovinos, ovinos, y caprinos.

PERÍODO DE RETIRO: Carne y despojos 13 días, leche 4 días. No usar en ovejas que produzcan leche para consumo humano.

FABRICADO Y DISTRIBUIDO POR:

RANQHAY E.I.R.Limport - Export. ranqhay@outlook.com
Calle Omega B-9 Urb. Juan XXIII San Borja -Lima

Reg. SENASA: 00006234

VETERINARIO RESPONSABLE:
M .V. M.Sc. ROBERTO ANTONIO ACOSTA GALVEZ

RUC 20601996996
CEL: 51 96135 6604

Reg. SENASA : F. 008.002.N.01253

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

COMPOSICIÓN POR CADA 1mL.:

Oxyclozanide	60 mg.
Clorhidrato de Levamisol	30 mg.
Excipientes c.s.p.	1 ml.

Si los animales deben ser tratados colectivamente en lugar de individualmente, deben agruparse de acuerdo con su peso corporal y administrarse en consecuencia para evitar una sobredosis o una dosis insuficiente.

ALMACENAMIENTO

Almacenar en un lugar seco y fresco, protegido de la luz. y la húmedad, temperaturas entre 15 ºC y 30ºC

PRECAUCIONES

Almacenar en un lugar fresco y seco, protegido de la luz. Conservar por debajo de 15 - 30ºC. NO CONGELAR. Eliminar los envases en lugares autorizados, evite la contaminación ambiental. Mantenga el envase bien cerrado. No utilizar conjuntamente con otros medicamentos.

CONTRAINDICACIONES

No administrar en animales con hipersensibilidad a los pricipios activos o al excipiente. Administración a animales con función hepática alterada. No administrar concomitante de pirantel, morantel u organofosforados por los menos 14 días antes o despues del tratamiento con este producto. Reacciones adversas ninguna.

EFECTOS COLATERALES

La sobredosis pueden causar excitación, lagrimeo, sudoración, salivación excesiva, tos, hipernea, vómitos, cólicos y espasmos.

PRODUCTO PERUANO

LOTE:
FECHA DE FABRICACIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO: