INSERTO DE ALLIN DOXICICLINA 200 INYECTABLE

1.	**DENOMINACION:**	ALLIN DOXICICLINA 200 Inyectable es una solución inyectable a base de Doxiciclina, un antibacteriano de amplio espectro de uso veterinario.
2.	**COMPOSICIÓN:**	FORMULA: INGREDIENTES DE FORMULA POR CADA MILILITRO: Doxiciclina Hiclato 200 mg **Excipientes**: Alcohol Bencílico (E1519) 20 mg Formaldehido sufoxilato sódico 5 mg Cloruro de Magnesio Hexa hidrato 2 mg Dietilenglicol monoetiléter 3 mg Agua para inyectables c.s.p. 1 mL
3.	**FORMA FARMACÉUTICA:**	Solución inyectable
4.	**DATOS CLÍNICOS:**	
	a. Especie de Destino	Vacunos, porcinos, ovinos, caprinos, camélidos sudamericanos, caninos, felinos y aves
	b. Indicaciones de uso	La Doxiciclina es un antibacteriano de amplio espectro y actúa en la Ehrlichiosis por tiempo prolongado (28 días) así como e infecciones respiratorias bacterianas producidas por organismos sensibles a la doxiciclina, entre los que se incluyen: Staphylococcus aureus y otras Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Bordetella bronchiseptica y Pasteurella spp. Bacterias Gram-negativas: Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Yersinia pestis, Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis, Burkholderia pseudomallei, Stenotrophomonas maltophilia, Bartonella spp. Bacteria Gram-positivas: Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes, Streptococcus pneumoniae, Enterococcus faecalis, Listeria monocytogenes, Bacillus anthracis, Nocardia spp. Otras bacterias: Legionella pneumophila, Mycoplasma pneumoniae, Chlamydophila pneumoniae, Rickettsia spp., Coxiella bunetii.
	c. Contraindicaciones	La doxiciclina es bastante segura y posee pocos efectos adversos como: Trastornos gastrointestinales después de la administración parenteral que pueden variar desde una enteritis inespecífica a enterocolitis con toxicosis, colapso, deshidratación e hipopotasemia. Se han observado casos de hipotensión y colapso súbito cuando la vía de administración ha sido la intravenosa rápida, sobre todo en bovino. No usar en animales con hipersensibilidad conocida a las tetraciclinas y/o a alguno de los excipientes. No usar en animales con alteraciones hepáticas.
	d. Precauciones especiales de uso	• No superar la pauta posológica recomendada. • Guardar las tabletas fuera del alcance de los animales, con el fin de evitar una ingesta accidental. Debido a la posible variabilidad (temporal, geográfica) en la aparición de la resistencia de la bacteria a la doxiciclina, se recomienda realizar muestras bacteriológicas y pruebas de susceptibilidad. Deberán tenerse en cuenta las políticas antimicrobianas oficiales, nacionales y regionales cuando se administre el medicamento veterinario. Administrar el medicamento veterinario sin seguir las instrucciones proporcionadas en el RCP puede aumentar la prevalencia de bacterias resistentes a la doxiciclina y puede disminuir la eficacia del tratamiento con otras tetraciclinas, debido a la posible resistencia cruzada. • Con el fin de reducir la probabilidad de irritación esofágica, así como otros efectos secundarios gastrointestinales, como vómitos, el medicamento veterinario debe administrarse con alimentos. • Deberá prestarse especial atención al administrar el medicamento veterinario a animales con enfermedades hepáticas. • El medicamento veterinario debe administrarse con precaución en el caso de animales jóvenes, dado que las tetraciclinas como clase pueden provocar discromía permanente en los dientes cuando se administra durante el desarrollo de estos. • La Empresa RANQHAY EIRL no se responsabiliza por los daños causados por el mal uso del producto.

		• Precauciones especiales para el medio ambiente o de eliminación de residuos: ninguno. • No deseche el producto o el contenedor vacío en los estanques, ríos o arroyos. • Los envases vacíos y cualquier resto de producto deben ser eliminados envolviendo el envase en papel y depositarlo en la basura. • Las tetraciclinas y omeprazol pueden provocar reacciones de hipersensibilidad (alergia). • Las personas con hipersensibilidad conocida a las tetraciclinas y omeprazol deberán evitar el contacto con el medicamento veterinario. • Lavar las manos después de su uso. • Si desarrolla síntomas después de la exposición, como erupción cutánea, busque asistencia médica de inmediato y enseñe el prospecto del envase al facultativo. • En caso de ingesta accidental, busque asistencia médica.
	e. Posología y modo de administración	Aplicación parenteral, vía intramuscular profunda o subcutánea • Para todas las especies: caninos, felinos, porcinos, vacunos, ovinos, caprino, camélidos sudamericanos y aves: la dosis de Doxiciclina es 10 – 20 mg/Kg de peso vivo / día, equivalente a 0,5 mL por cada 10 kg de peso vivo / día de Allin Doxiciclina 200 Inyectable, por 4 a 5 días. • En el caso de las aves 10 mg /kg p.v. es equivalente 0,043 mL / kg de peso vivo del medicamento.
	f. Periodo de retiro	Vacunos: Carne 28 días Leche: Su uso no está autorizado en animales cuya leche se utiliza para consumo humano. Porcino: Carne: 28 días. Ovinos y caprinos: Carne: 28 días Camélidos sudamericanos: Carne: 28 días Aves: Carne 3 días Caninos y Felinos: NO APLICA
5.	**DATOS FARMACEUTICOS:**	
	a. Tiempo de vida útil	36 meses para la presentación del blíster.
	b. Precauciones de almacenamiento	Conservar el producto en un ambiente fresco y seco, entre 15 ºC y 30 ºC. Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

FABRICADO y DISTRIBUIDO POR:

RANQHAY E.I.R.L. Reg. SENASA: 00006234

Calle Omega B-9, Urb. Juan XXIII, San Borja, Lima

https://ranqhayeirl.godaddysites.com/

ranqhay@outlook.com, Cel: 51 – 961356604

M.V. M.Sc. Roberto A. Acosta Gálvez

Responsable Técnico

Reg. SENASA: **F.082.001.N.01078**

FEC.: FABRICACION:

FEC.: VENCIMIENTO: