INSERTO DE ALLIN AMOXICLAVULAN

<table>
<tr><td>1.</td><td>DENOMINACION:</td><td>ALLIN AMOXICLAVULAN es un comprimido o tableta de uso veterinario oral; que contiene dos potentes antibacterianos: la Amoxicilina y el Ácido Clavulánico de amplio espectro.</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>COMPOSICIÓN:</td><td>FORMULA: INGREDIENTES DE FORMULA DE CADA TABLETA de 400 mg.
Amoxicilina 50 mg
Ácido Clavulánico 15 mg
Excipiente c.s.p. para 1 tableta</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>FORMA FARMACÉUTICA:</td><td>Tableta</td></tr>
<tr><td>4.</td><td colspan="2">DATOS CLÍNICOS:</td></tr>
<tr><td></td><td>a. Especie de Destino</td><td>Gatos y perros</td></tr>
<tr><td></td><td>b. Indicaciones de uso</td><td>ALLIN AMOXICLAVULAN es un antibacteriano, para el tratamiento de infecciones en caninos y felinos causadas por bacterias sensibles a la amoxicilina en combinación con ácido clavulánico, específicamente:
Infecciones cutáneas (entre las que se incluyen pioderma superficiales y profundos) asociadas a Staphylococcus spp. (entre los que se incluyen las cepas productoras de betalactamasa) y Streptococcus spp.
Infecciones del tracto urinario asociadas a Staphylococcus spp. (inclusive cepas productoras de beta-lactamasas), Streptococcus spp., Escherichia coli (inclusive cepas productoras de beta-lactamasas), Fusobacterium necrophorum y Proteus spp.
Infecciones del tracto respiratorio asociadas a Staphylococcus spp. (inclusive cepas productoras de beta-lactamasas), estreptococos y al género Pasteurella.
Infecciones del tracto gastrointestinal asociadas a Escherichia coli (inclusive cepas productoras de beta-lactamasas), y Proteus spp.
Infecciones de la cavidad bucal (membrana mucosa) y dentales (abscesos dentales) asociadas a Clostridium spp., Corynebacterium spp., Staphylococcus spp. (inclusive cepas productoras de betalactamasa), Streptococcus spp., Bacteroides spp. (inclusive cepas productoras de betalactamasa), Fusobacterium necrophorum y Pasteurella spp.</td></tr>
<tr><td></td><td>c. Contraindicaciones</td><td>No usar en animales con hipersensibilidad conocida a la penicilina o a otras sustancias del grupo beta-lactámicos o a algún excipiente.
No usar en disfunción grave de los riñones acompañada por anuria y oliguria.
No usar en conejos, cobayas, hámsteres, chinchillas ni jerbos.
No usar en caso de resistencia conocida a la combinación.</td></tr>
<tr><td></td><td>d. Precauciones especiales de uso</td><td>• Las penicilinas y cefalosporinas pueden producir reacciones de hipersensibilidad (alergia) después de la inyección, inhalación, ingestión o contacto con la piel.
• La hipersensibilidad a las penicilinas puede conducir a reacciones cruzadas a las cefalosporinas y viceversa.
• Las reacciones alérgicas a estas sustancias pueden ser ocasionalmente graves.
• No manipule este medicamento veterinario si sabe que está sensibilizado, o si se le ha aconsejado no trabajar con dichas preparaciones.
• Manipule este medicamento veterinario con gran cuidado para evitar la exposición, tomando todas las precauciones recomendadas.
• Si desarrolla síntomas tras la exposición tales como erupción cutánea, consulte a su médico y muéstrele estas advertencias.
• La hinchazón de la cara, labios u ojos o la dificultad para respirar son síntomas más graves y requieren atención médica urgente.
• Lávese las manos después de usar.
• Evitar la dispersión del producto en el medio ambiente.</td></tr>
<tr><td></td><td>e. Posología y modo de administración</td><td>En perros y gatos, administrar una tableta de ALLIN AMOXICLAVULAN
DOSIS CURATIVA Y PREVENTIVA DE ALLIN AMOXICLAVULAN SEGÚN PRINCIPIO ACTIVO
<table>
<tr><th>Peso corporal (kg)</th><th>amoxicilina 50 mg/ ácido clavulánico 12,5 mg</th></tr>
<tr><td>1,25 - 2,5</td><td>½</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

		<table><tr><td>2,6 – 5.0</td><td>1</td></tr><tr><td>5.1 – 7.5</td><td>1 1/2</td></tr><tr><td>7.6 - 10</td><td>2</td></tr></table> En infecciones severas en cada especie de destino, la dosis puede duplicarse a 20 mg de amoxicilina / 5 mg de ácido clavulánico / kg de peso dos veces al día.
	f. Periodo de retiro	No aplica
5.	**DATOS FARMACEUTICOS:**	
	a. Tiempo de vida útil	36 meses para la presentación del blíster.
	b. Precauciones de almacenamiento	Conservar el producto en un ambiente fresco y seco, entre 15 ºC y 25 ºC. Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.
	c. **RANQHAY EIRL** **REG. SENASA N°6234** **RUC 20601996996**	Omega B-9 Urb. Juan XXIII, San Borja, Lima Celular: 961356604 – 923522621 ranqhay@outlook.com